

SIGNALEN* BIJ STOORNIS IN MIDDELENGEBRUIK OF GEDRAGSVERSLAVING

1

- Veel vertellen over (sociaal) gebruik
- Uitbundig gedrag op sociale gelegenheden
- Gelegenheidszoeker
- Gebruik van verkleinwoorden zoals drankje, wijntje, biertje, pilletje, etc.
- Onderwerpverandering bij napraten over een feestje of borrel
- Onopvallend bijschenken
- Ondanks hoge inname weinig effect zien (tolerantie)
- Frequent onder invloed op sociale gelegenheden
- Geheelonthouder op sociale gelegenheden en dat ook benadrukken, en thuis des te meer gebruiken
- Toename van negatieve gedachten, gevoelens en gedrag

3

- Woede-uitbarstingen op het werk
- Klachten van patiënten en stafleden
- Professionele desinteresse
- Afzeggen van afspraken en vaker absent zijn
- Afnemen van klinische vaardigheden
- Voortgangsevaluaties worden slechter
- (Psychoactief) medicijngebruik op eigen voorschrift
- Ruikt naar alcohol tijdens werk
- Huiselijk geweld, echtscheiding

2

- Toename van lichamelijke klachten, vermoeidheid en ziekte
- Verminderd contact met vrienden en familie
- Spanningen in het gezin, conflicten, ontrouw
- Minder goed gekleed en verzorgd
- Minder betrouwbaar, bijvoorbeeld op het gebied van afspraken
- Ongezonde coping met probleemsituaties
- Meer tijd aanwezig op het werk

4

- Intoxicatie op het werk
- Uiterlijke veranderingen passend bij een chronische aandoening
- Medische fout of ongeluk veroorzaken
- Extreme persoonlijke isolatie
- Suïcidale uitingen of pogingen
- Suïcide

**HEB JE VRAGEN?
BEL OF E-MAIL ONS GERUST!**

Steunpunt: 0900-0168
Overige vragen:
info@abs-zorgprofessionals.nl

*De signalen zijn in te delen in fase 1 tot en met 4. Niet iedereen doorloopt alle vier de fases. Deels gebaseerd op Van der Wal, Van Rens, Bokdam, De Jong en Scheffer, 2011.